

**PPP OMOLOGATE ÎN ROMÂNIA PENTRU CULTURA DE TOMATE**

**FUNGICIDE**

Nr. crt.	Produs de protecție a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	<b>ALLSTAR 250 SC</b>	Phytophthora infestans (Mana tomatelor), Alternaria spp. (Alternarioza)	0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infestare)
2.	<b>AZUMO WG</b>	Fainarea	2,0 kg/ha
3.	<b>BOTECTOR</b>	Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu)	1,0 kg/ha
4.	<b>BOUILLIE BORDELAISE WDG</b>	Pseudomonas tomato (patarea pustulară), Alternaria solani (alternarioza), Phytophthora infestans (mana), Xanthomonas vesicatoria (basicarea fructelor)	0,75% (7,5 kg/ha)
5.	<b>CABRIO TOP</b>	Mana, fainarea, patarea alba, patarea cafenie, patarea bruna	1,5 - 2,0 kg/ha
6.	<b>CALIZI / (SINPRO - a doua denumire comercială)</b>	Mana, alternarioza, fainarea, patarea cafenie	0,8 l/ha
7.	<b>CAPTAN 80 WDG / (CAIMAN - a doua denumire comercială)</b>	Mana solanaceelor, patarea bruna	0,15% (1,5 kg/ha)
8.	<b>CARIAL STAR</b>	Mana, alternarioza	0,6 l/ha pentru culturi în câmp și spații protejate
9.	<b>CASINO ROYALE</b>	Alternaria spp. (Alternarioza)	1,5 Kg/ha
10.	<b>CHAMP 77 WG / (COPPERMAX - a doua denumire comercială)</b>	Basicarea fructelor, patarea pustulară	2,0 kg/ha (0,2%)
11.	<b>CUPROFIX ULTRA / NOVICURE-a doua denumire comercială</b>	Mana, alternarioza, putregaiul radacinilor și fructelor, basicarea fructelor, patarea pustulară	1,6-2,4 kg/ha
12.	<b>CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comercială)</b>	Mana, alternarioza  Mana  Mana	3,0-4,0 l/ha  5,3 l/ha pentru culturi în spații protejate  53 ml/100 mp pentru culturi în spații protejate
13.	<b>CURENOX 50</b>	Phytophthora infestans (mana tomatelor), Alternaria solani (alternarioza)	1,5-2,0 kg/ha
14.	<b>DAGONIS</b>	Fainarea Alternarioza, patarea cafenie Fainarea Alternarioza	0,6 L/ha 1,0 L/ha 0,6 L/ha 1,0 L/ha
15.	<b>DIFCOR 250 EC</b>	Alternarioza, putregaiul cenușiu, putregaiul	0,5 l/ha

		alb	
16.	<b>EQUATION PRO</b>	Phytophthora infestans (mana tomatelor), Xanthomonas vesicatoria (basicarea fructelor)	0,4 kg/ha
17.	<b>FLOSUL</b>	Fainarea	2,0 L/ha
18.	<b>FLOWBRIX /</b> ( <b>COPPER-FIELD - a doua</b> <b>denumire comerciala</b> )	Mana, agenti patogeni bacterieni	2,6 ml/10 mp
		Mana, agenti patogeni bacterien	2.5 l/ha
19.	<b>FOLPAN 80 WDG /</b> ( <b>FLOVINE - a doua</b> <b>denumire comerciala</b> )	Mana tomatelor	0,15%
		Caderea rasadurilor	0,15%(4-5 sol./mp)
		Mana tomatelor	0,15%(4-5 sol./mp)
		Rizoctonioza	0,15%(4-5 sol./mp)
20.	<b>KOCIDE 2000</b>	Mana, patarea pustulara	2,0 kg/ha (0,2%)
21.	<b>LIETO / (ZETANIL - a</b> <b>doua denumire comerciala)</b>	Mana	0,40 kg/ha
22.	<b>MERPAN 80 WDG /</b> ( <b>CAPTADIN 80 WDG</b> <b>- a doua denumire</b> <b>comerciala)</b>	Mana tomatelor	0,15 % (1,5 kg/ha in 1000 L apa)
23.	<b>ORIOUS 25 EW /</b> ( <b>SALVATOR 25 EW - a</b> <b>doua denumire comerciala)</b>	Alternarioza	0,05% (0,5 L/ha in 1000 L apa)
24.	<b>POLYRAM DF</b>	Patarea cafenie a tomatelor, alternarioza, mana tomatelor, patarea alba a frunzelor de tomate	0,2%
25.	<b>PROPLANT 72,2 SL</b>	Mana de sol a tomatelor	0,15-0,25% (3-5 l sol./m2)
		Mana tomatelor	0,15-0,25% (1,5-2,5 l/ha)
		Căderea plăntuțelor	0,15-0,25% (3-5 l sol./m2)
26.	<b>PYRUS 400 SC /</b> ( <b>PAPYRUS 400 SC - a doua</b> <b>denumire comerciala)</b>	Putregaiul cenușiu	0,15% (1,5 l/ha)
27.	<b>REFLECT</b>	Fainarea	1,0 l/ha se aplica la culturi in sere si solarii
28.	<b>SCALA</b>	Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu)	2,0 L/ha
29.	<b>SCORE 250 EC /</b> ( <b>MAVITA 250 EC - a</b> <b>doua denumire comerciala)</b>	Alternarioza (patarea bruna)	0,5 L/ha
30.	<b>SIGNUM / (SYREX STAR</b> <b>-doua denumire comerciala)</b>	Putregaiul cenusiu, fainarea	1,5 kg/ha
31.	<b>SULBARI</b>	Leveillula taurica (fainarea)	5,0 kg/ha
32.	<b>SWITCH 62,5 WG</b>	Putregaiul cenusiu	0,8-1,0 kg/ha
33.	<b>VINCARE 51,7 WG</b>	Mana tomatelor	1,6-2,0 kg/ha
34.	<b>ZEAMA BORDELEZA</b> <b>TIP „MIF” / (ZEAMA</b> <b>BORDELEZA VALLES - a</b> <b>doua denumire comerciala)</b>	Phytophthora infestans (Mana tomatelor)	3,75-5,0 kg/ha
		Alternaria solani (Alternarioza)	3,75-5,0 kg/ha
35.	<b>DOMARK 10 EC</b>	Fainarea	0,4 L/ha (0,04%)

36.	<b>REVUS 250 SC</b>	Mana tomatelor	0,6 l/ha
		Phytophthora infestans (mana tomatelor)	0,6 L/ha
37.	<b>VITRA 50 WP / (CUPRIDIN - a doua denumire comerciala)</b>	Mana, alternarioza, patarea bacteriana, putregaiul radacinilor si fructelor, patarea pustulara a fructelor de tomate	1,5-2,0 kg/ha
38.	<b>CYCLO-R LIQUIDO</b>	Mana tomatelor	2,4-4,0 l/ha
39.	<b>KANTAREL</b>	Fainarea (sera)	0,3-0,4 L/ha (0,03-0,04%)
40.	<b>OMIX / (EDEGAL - a doua denumire comerciala)</b>	Mana, caderea plantutelor	300 mL/ m <sup>3</sup> /substrat
		Mana, caderea plantutelor	5-6 mL/mp
41.	<b>COPFORCE EXTRA / (CUPMAN - a doua denumire comerciala)</b>	Mana, alternarioza	2,0 kg/ha
42.	<b>CUPERTINE SUPER / (COMBIDUO COBRE - a doua denumire comerciala)</b>	Mana, alternarioza, antracnoza, vestejirea bacteriana, arsura bacteriana	3,5 kg/ha
		Mana tomatelor	3,5 kg/ha
43.	<b>TAEGRO</b>	Mana tomatelor	0,37 kg/ha
		Mana tomatelor, fainarea, patarea bruna a frunzelor de tomate (alternarioza)	0,37 kg/ha
44.	<b>THIOVIT JET 80 WG</b>	Fainarea (efect secundar asupra acarienilor)	5,0 kg/ha
45.	<b>ARMETIL COBRE / (MANOXIN COMBI-a doua denumire comerciala)</b>	Mana tomatelor	2,5 kg/ha
46.	<b>REVUS 250 SC</b>	Mana tomatelor	0,6 l/ha
		Phytophthora infestans (mana tomatelor)	0,6 L/ha
47.	<b>LUNA PRIVILEGE 500 SC</b>	Putregaiul cenusiu	0,5 l/ha (0,05%)
48.	<b>LUNA SENSATION 500 SC</b>	Botrytis cinerea (putregaiul cenusiu)	0,6 L/ha
49.	<b>FYTOSAVE</b>	Leveillula taurica (Fainare)	2,0 L/ha
50.	<b>LEGADO / (DIAGONAL - a doua denumire comerciala)</b>	Fainarea	0,8 l/ha
51.	<b>EVALIA / (TAZER - a doua denumire comerciala)</b>	Mana, fainarea, alternarioza	0,05-0,08% (50-80 ml/100 l apa)
52.	<b>PREVICUR ENERGY</b>	Mana, caderea plantutelor, spatii protejate	3 L/ha tratament aplicat prin picurare
		Mana, caderea plantutelor, spatii protejate	3 mL/mp tratament aplicat la sol
53.	<b>SERENADE ASO</b>	Botrytis cinerea (putregaiul cenusiu), Pseudomonas syringae (patarea pustulara a fructelor), Xanthomonas spp. (patarea bacteriana a frunzelor)	4,0-8,0 L/ha
		Fusarium oxysporum (fusarioza)	10,0 L/ha
54.	<b>TELDOR 500 SC</b>	Putregaiul cenusiu, spatii protejate	0,8 L/ha

55.	<b>TRIUMF 40 WG</b>	Mana, spatii protejate	2,0-2,5 kg/ha
56.	<b>BASAMID GRANULE</b>	Mana de sol, fuzarioza, ofilirea vasculara	500 kg/ha
57.	<b>SONATA</b>	Leveillula taurica (fainarea), Oidium lycopersici (fainarea)	5,0-10,0 L/ha
58.	<b>T34 BIOCONTROL</b>	Caderea plantelor	0,5 g/mp de substrat pana la 5 cm adancime
		Caderea plantelor	0,01 g/l sol sau substrat sau 0,005g/l+0,005 g/l
		Caderea plantelor	10 g/ m <sup>3</sup> de substrat

## **INSECTICIDE**

Nr. crt.	Produs de protecție a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	<b>AFFIRM</b>	Minierul frunzelor de tomate, omida fructelor	1,5 kg/ha
2.	<b>AVAUNT 150 EC</b>	Omida fructelor de tomate, omida sfeclei	0,250 l/ha în câmp și spații protejate )
3.	<b>BELTHIRUL</b>	Omizile fructelor	0,25-0,50 kg/ha (800-1000 l apa/ha)
4.	<b>COLUMBO 0,8 MG</b>	Viermii sarma, buha semanaturilor	12 kg/ha
5.	<b>CORAGEN</b>	Omida fructelor, molia tomatelor	175 ml/ha
6.	<b>COROCID SUPER</b>	Coropisnita	20 kg/ha
7.	<b>ERCOLE</b>	Buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha
8.	<b>FLORAMITE 240 SC</b>	Paianjenii	0,4-0,6 l/ha
9.	<b>FURY GEO</b>	Viermii sarma	12-15 kg/ha
10.	<b>LEBRON 0,5 G</b>	Viermii sarma, buha semanaturilor, Blaniulus guttulatus, centipede, musca morcovului, carabusul de mai	15-20 kg/ha
11.	<b>MICROSED GEO / (SOBEK UP - a doua denumire comerciala)</b>	Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp. (buha), Chaetocnema tibialis (puricele sfeclei), Ceutorhynchus pleurostigma (gargarita), Blaniulus guttulatus (sarpele orb, miriapod), Hylemya spp. (muste), Chamaepsila rosae (musca morcovului), Tipula spp. (țânțari)	16-20 kg/ha se aplica prin incorporare la semant sau transplantare
12.	<b>PLINTO 2,5 EC / (ALFASURE 2,5 EC - a doua denumire comerciala)</b>	Omida fructelor, buha gama	0,4-0,6 l/ha
13.	<b>POLECI / (DECA 2,5 EC - a doua denumire comerciala)</b>	Afide, tripsi, musculita alba de seara	30-50 ml/hl apa (0,03-0,05 %)
14.	<b>TRIKA EXPERT</b>	Buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha
15.	<b>ALVERDE</b>	Omida fructificațiilor, larve L1-L3	0,1 % (1,0 l/ha/1000 l apa)

16.	<b>SIVANTO PRIME 200 SL</b>	Afide (Aphis gossypii, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae); Musculițe (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)	0,56 L/ha
17.	<b>VOLIAM TARGO</b>	Omida fructelor, buha legumelor	0,8 L/ha
18.	<b>GRIAL / (DIEDRO - a doua denumire comerciala)</b>	Afide, omizi	0,5 L/ha (50-166 mL/hL)
19.	<b>VERTIMEC PRO</b>	Păianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha
20.	<b>MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)</b>	Tripsul californian	0,04%
21.	<b>FASTER 10 CE</b>	Păduchele verde	0,02% (0,2 l/ha)
22.	<b>VYDATE 10 L</b>	Nematozi (nematodul tulpinilor si bulbilor, nematozii cu chisti, nematozii galicoli, Pratylenchus, Tylenchulus) Insecte (omida miniera, musculita alba de sera, afide, musculita tutunului, paducele verde al piersicului, tripsul tutunului)	10 L/ha,câmp
		Nematodul galicol al radacinilor, musculita alba de sera, musca minieră a solanaceelor	10 L/ha, sera si solarii
23.	<b>VYDATE 10 G</b>	Musulita alba de sera, nematozii galicoli, nematodul tulpinilor	30,0-55,0 kg/ha, câmp, sera si solarii
24.	<b>LIMOCIDE</b>	Thrips tabaci	4,0 L/ha,sere
		Trialeurodes vaporariorum (Musculita alba de sera)	2,0 L/ha ,sere
25.	<b>FLIPPER</b>	Afide, musculita alba de sera, acarieni	20,0 L/ha, câmp
		Afide, musculita alba de sera, acarieni	16,0 L/ha, spații protejate)
26.	<b>APACHE / (VERTAB - a doua denumire comerciala)</b>	Musca miniera,seră	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel
		Musca miniera, câmp	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl)
		Acarianul rosu comun, acarianul lat, câmp	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl)
27.	<b>AZATIN EC</b>	Afide, Trialeurodes vaporariorum, Leptinotarsa decemlineata, Liriomyza spp., Noctuide (Trichoplusia ni, Helicoverpa armigera, Autographa gamma, Mamestra brassicae, Spodoptera exigua), Tripsi, Tuta absoluta	1,0 - 1,5 L /ha, sere Se aplică la avertizare.
28.	<b>BACTOSPEINE DF / (DIPEL DF - a doua denumire comerciala)</b>	Omida fructelor, buha sfeclei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului	0,5-1,0 kg/ha , sere
29.	<b>BERMECTINE</b>	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filocoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL), sere
		Molia tomatelor	1,0 L/ha (100 mL/hL), sere
		Muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL), sere
		Acarianul rosu comun, acarianul lat, mustele	0,15-1,0 L/ha (50-100

			mL/hL) , câmp
30.	<b>PREV GOLD</b>	Acarieni (Tetranychus urticae), Musculita alba (Trialeurodes aporariorum)	0,4-0,8% (maxim 8 L/ha)
31.	<b>SAFRAN 1.8 EC / (VARGAS 1.8 EC - a doua denumire comerciala)</b>	Musca miniera	0,09%(0,9 l/ha in 1000 l apa) nu se aplica in timpul inlforitului.
32.	<b>HARPUN</b>	Musculita alba de sera	75 ml/100 L apa , solarii
33.	<b>JUVINAL 10 EC</b>	Musculita alba de sera	0,05% , solarii
34.	<b>DELTAM</b>	Afide	8,0 mL in 10 L apa/100 mp
		Omizi defoliatoare	5,0 mL in 10 L apa/100 mp
35.	<b>MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)</b>	Helicoverpa armigera(Omida fructelor), Macrosiphon euphorbiae (Paduchele verde al solanaceelor)	0,05% (0,5 L/ha în 1000 L apa)
36.	<b>VANTEX 60 CS / (NEXIDE 60 CS - a doua dnumire comeciala)</b>	Omida capsulelor (larve L1 - L2)	0,02 % (0,2 l p.c. /ha)
37.	<b>VERTIMEC 1,8% EC</b>	Acarieni	60 mL/hl , câmp
		Musca miniera	60-80 mL/hl , sera
		Acarieni, tripsul californian, musca miniera, trpsul comun, acarieni galicoli,	60-80 mL/hl , spații protejate
38.	<b>LASER 240 SC</b>	Musca miniera a solanaceelor	0,05%
39.	<b>SANIUM SYSTEM</b>	Afide (Aphis gossypii, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae); Trialeurodes vaporariorum (Musculita alba de sera)	4,5 L/ha , sere și solarii
40.	<b>MINECTO ALPHA</b>	Tripsul californian, musculita alba de sera, omizi defoliatoare, omida fructelor, musca miniera, molia tomatelor	1,0-1,25 L/ha (1,0 L/ha-irigare prin picurare sau 1,25 L/ha-pulverizare )
41.	<b>NOFLY WP</b>	Musculita alba de sera	200-250 g/hl
42.	<b>REQUIEM PRIME</b>	Musculita alba de sera, musculita alba a bumbacului, tripsul californian, acarianul rosu comun	0,65 % maxim 10 L/ha
43.	<b>SANMITE 10 SC</b>	Paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun. musculita alba de sera, musculita tutunului	1,5 L/ha
44.	<b>SPRUZIT</b>	Aphis gossypii, Aulacorthum solani (Afide)	6,0 L/ha in 600 L apa (talie plantei <50 cm)
		Aphis gossypii, Aulacorthum solani (Afide)	9,0 L/ha in 900 L apa (talie plantei 50-125 cm)
		Aphis gossypii, Aulacorthum solani (Afide)	12,0 L/ha in 1200 L apa (talie plantei >125 cm)
45.	<b>CYPERGUARD 25 EC / (FOSTOC - a doua denumire comerciala)</b>	Paduchele solanaceelor, gandacul din Colorado	0,008%
46.	<b>DELMUR</b>	Aphis gossypii ,Macrosiphum euphorbiae ,	500 mL/ha

		Myzus persicae ,Helicoverpa armigera , Spodoptera sp.,Spodoptera exigua , Spodoptera littoralis, Agrotis segetum, Heliiothis sp., Chrysodeixis calcite, Autographa gamma, Tuta absoluta.	
--	--	--	--

### **ACARICIDE**

Nr. crt.	Produs de protecție a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	<b>NISSORUN 10 WP</b>	Acarianul rosu comun	1,0 kg/ha
2.	<b>KANEMITE SC</b>	Paianjenul rosu comun	In spatii protejate 1,25 L/ha in 1200 L apa
3.	<b>MOVENTO 100 SC</b>	Tetranychus urticae (Acarianul roșu comun)	0,75 L/ha
4.	<b>VERTIGO 018 EC</b>	Acarianul stacojiu	0,05 %

### **ERBICIDE**

Nr. crt.	Produs de protecție a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	<b>BUZZIN</b>	Buruieni dicotiledonate si unele monocotiledonate	0,50 kg/ha aplicat la plantare
2.	<b>MATECOR EXPRESS</b>	<b>Buruieni dicotiledonate si monocotiledonate anuale:</b> teisor, stir, scanteiuta, spanac salbatic, meisor, iarba barboasa, euforbia, fumarita, sugel puturos, raigras, musetelul, firuta, hrisca, grasita, mohor, mustar salbatic, susai, rocoina, urzica, ventrili	0,4 kg/ha Se aplica pretransplantare
		<b>Buruieni dicotiledonate si monocotiledonate anuale:</b> teisor, stir, scanteiuta, spanac salbatic, meisor, iarba barboasa, euforbia, fumarita, sugel puturos, raigras, musetelul, firuta, hrisca, grasita, mohor, mustar salbatic, susai, rocoina, urzica, ventrili	0,4-0,75 kg/ha Se aplica post rasarire si post-transplantare ,stadiul de 8-9 frunze(BBCH 18-19)
3.	<b>SHARPEN 40 SC / (PENDISOL 40 SC - a doua denumire comerciala)</b>	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate	3,3-4,1 l/ha se aplica preemergent cu 2-3 zile inainte de plantare
4.	<b>STOMP AQUA / (PROWL AQUA - a doua denumire comerciala)</b>	Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate	1,0-3,0 l/ha inaintea transplantarii
5.	<b>STRATOS ULTRA / (FOCUS - a doua denumire)</b>	Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (aplicat singur) Postemergent

	<b>comerciala)</b>	Buruieni monocotiledonate perene	2L/ha+2L/ha adjuvant (DASH) Postemergent
		Buruieni monocotiledonate anuale	1-2 L/ha (aplicat singur) Postemergent
		Buruieni monocotiledonate anuale	2L/ha+2L/ha adjuvant (DASH) Postemergent
6.	<b>TARGA MAX / (GRAMIN MAX - a doua denumire comerciala)</b>	Buruieni monocotiledonate anuale	0,4-0,6 l/ha Postemergent, buruieni monocotiledonate anuale 4-6 frunze, Shorgum halepense pana la 15-25 cm, Agropyron repens sub 20 cm
		Buruieni monocotiledonate perene	0,6-1,25 l/ha Postemergent, buruieni monocotiledonate anuale 4-6 frunze, Shorgum halepense pana la 15-25 cm, Agropyron repens sub 20 cm
7.	<b>WISH TOP / (QUICK FORTE - a doua denumire comerciala)</b>	Buruieni monocotiledonate anuale si perene	0,83-1,25 L/ha
8.	<b>SENCOR LIQUID 600 SC</b>	Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate	0,45 l/ha Preemergent Tomate semanate
		Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate	0,35 l/ha Postemergent (la minim 40 de zile de la tratamentul in preemergență. Tomate semanate
		Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate	0,6 l/ha Preemergent, Tomate transplantate
9.	<b>FUSILADE FORTE</b>	Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 l/ha Tomate semanate direct in camp
		Buruieni monocotiledonate perene	1,0 l/ha Tomate semanate direct in camp
		Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 l/ha postemergent Tomate transplantate
		Buruieni monocotiledonate perene	1,3 l/ha postemergent Tomate transplantate
10.	<b>DEVRIKOL 45 F</b>	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate	3,0-4,0 L/ha se aplica inainte de semanat cu incorporare Tomate semanate direct in camp
11.	<b>DUAL GOLD 960 EC / (TENDER-a doua denumire comerciala)</b>	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale (mohor, busuioc salbatic)	1,0 l/ha Preemergent Tomate in camp (cultura infiintata prin rasad)



12.	<b>METOS 960 EC</b>	Buruieni anuale monocotiledonate și dicotiledonate (Setaria, Galinsoga)	1,0 L/ha Se aplica preemergent Tomate transpl., tomate semădate direct in camp.
13.	<b>AGIL 100 EC / (ZETROLA - a doua denumire comerciala)</b>	Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 L/ha ,postemergent Tomate transplantate
		Costrei din rizomi	1,0 L/ha ,postemergent Tomate transplantate
14.	<b>METRIPHAR 70 WG</b>	Buruieni dicotiledonate `si unele monocotiledonate	0,3 kg/ha Tomate transplantate
15.	<b>PANTERA 40 EC / (RANGO - a doua denumire comerciala)</b>	Buruieni monocotiledonate anuale	0,75 l/ha postemergent Tomate transplantate
16.	<b>TARGA SUPER 5 EC</b>	Buruieni monocotiledonate anuale	1,0 l/ha postemergent Tomate transplantate
17.	<b>TITUS 25 DF / (TAROT - a doua denumire comerciala)</b>	Buruieni monocotiledonate anuale și perene și unele dicotiledonate	40-60 g/ha +Trend90, 0,1 % surfactant Postemergent Se aplica primăvara de la prima frunză până la prima inflorescență a culturii (BBCH 11-51)

### **REGULATORI DE CREȘTERE**

Nr. crt.	Produs de protecție a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	<b>ATONIK</b>	Obținerea de spor de producție	0,5 l/ha Se aplica de la apariția primelor inflorescențe până la apariția primelor fructe (BBCH 51-71)
2.	<b>SmartFresh ProTabs</b>	Regulator de creștere	0,084 g/ m <sup>3</sup> - se aplica nu mai târziu de 24 de ore, după recoltare
3.	<b>PLANTLINE E4</b>	Combaterea maturizării neuniforme	0,0125 L/m <sup>3</sup> Se aplica la sfârșitul ciclului de producție, timp de 6 săptămâni, noaptea, prin fumigare. Tomate spații protejate

## **NEMATOCIDE , TRATAMENT SOL**

Nr. crt.	Produs de protecție a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	<b>AFROMYL</b>	Nematozi	10,0 L/ha Se aplica la plantare / transplantare
2.	<b>BASAMID GRANULE</b>	Nematodul galicol al radacinilor	500 kg/ha - se administreaza la sol cu incorporare, inante de plantare
3.	<b>NEMATHORIN 10 G</b>	Nematodul galicol al radacinilor	15 kg/ha Tomate sera si solarii
4.	<b>NEMASOL 510</b>	Patogeni, nematozi, buruieni	700 L/ha -se aplica inainte de plantarea rasadurilor Tomate sera
5.	<b>TERVIGO</b>	Nematozii galicoli	5,0 L/ha Tomate spatii protejate
6.	<b>VELUM PRIME 400 SC</b>	Meloidogyne sp. (Nematozi), Leveillula taurica (Fainare)	625 mL/ha Tomate sera si solarii
7.	<b>VYDATE 10 L</b>	Nematozi (nematodul tulpinilor si bulbilor, nematozii cu chisti, nematozii galicoli, Pratylenchus, Tylenchulus) Insecte (omida miniera, musculita alba de sera, afide, musculita tutunului, paduchele verde al piersicului, tripsul tutunului)	10 L/ha
		Nematodul galicol al radacinilor, musculita alba de sera, musca miniera a solanaceelor	10 L/ha Tomate sera si solarii

## **Rodenticide, Moluscocide**

Nr. crt.	Produs de protecție a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	<b>IRONMAX PRO</b>	Limacși	7,0 kg/ha Tomate seră
2.	<b>AGROSAN B</b>	Melcii fără cochilie	15 kg/ha(administrare pe sol, fără incorporare ) Tomate in camp
3.	<b>SLUXX HP</b>	Melci fără cochilie (limacși); Melci cu cochilie	7,0 kg/ha Se aplică uniform pe sol, la începutul infestării.
4.	<b>ARVALIN</b>	Șoarecele de câmp	5 bucăți/galerie